



Blodsocker-prover Λ

Blodsocker-prover Λ

Före och 2 timmar efter måltider  Natt kl 02  kl 05

Före och 2 timmar efter måltider  Natt kl 02  kl 05

Tid för mat

Tid insulin

Insulin Dos (E) Sort

	Frukost	Lunch	Middag	Kvällsmat	Natt	Insulin E/24 tim

Basdos pump E/tim

Tid för mat

Tid insulin

Insulin Dos (E) Sort

	Frukost	Lunch	Middag	Kvällsmat	Natt	Insulin E/24 tim

Basdos pump E/tim

Sign s-sköt

Sign s-sköt

Kommentar till dagen:

Kommentar till dagen:

Förslag för morgondagen:

Förslag för morgondagen:

Mat ↓	Ordinationer till natten:	Insulin ↓
Ge druvsocker och 10-15 min senare smörgås + dryck om blodsockret är <input type="checkbox"/> < 3,5 <input type="checkbox"/> < .....	Inga extradoser oavsett blodsocker <input type="checkbox"/> Sort	
	Extrados vid b-glukos över 10 mmol/l ..... E .....	
	Extrados vid b-glukos över 15 mmol/l ..... E .....	
	Extrados vid b-glukos .....mmol/l ..... E .....	

Humalog	HL
NovoRapid	NR
Actrapid	AR
Insulatard	IT
Lantus	LA
Levemir	LE
NovoMix 30	N30
Humalog Mix50	H50
Vikt	..... kg
HbA1c	..... %
Diab. sedan	.....
Mottagn.	.....

Mat ↓	Ordinationer till natten:	Insulin ↓
Ge druvsocker och 10-15 min senare smörgås + dryck om blodsockret är <input type="checkbox"/> < 3,5 <input type="checkbox"/> < .....	Inga extradoser oavsett blodsocker <input type="checkbox"/> Sort	
	Extrados vid b-glukos över 10 mmol/l ..... E .....	
	Extrados vid b-glukos över 15 mmol/l ..... E .....	
	Extrados vid b-glukos .....mmol/l ..... E .....	